

der Bitte um Auskunft über diese Schnecke wendete, dass in der von Hensche citirten Arbeit v. Siebold's *P. doliolum* gar nicht erwähnt sei. In der That, als ich daraufhin die Siebold'sche Arbeit im Original (Preuss. Provinzialbl. Bd. 19 (nicht 23) 1838 p. 60) nachlas, finde ich bei der Gattung Pupa wörtlich Folgendes:

„2. Pupa.

5. *P. costulata* Nilss. p. 51.

6. *P. vertigo* Nilss. p. 53.

7. *P. antivertigo* Nilss. p. 52.

Diese 3 kleinen Moosschrauben wurden nebst einigen andern hierher gehörigen Arten, welche ich aber noch nicht habe bestimmen können, an der Cladau auf gelesen.“

Hierdurch wird also meine l. c. ausgesprochene Vermuthung, dass hier eine Verwechslung mit *P. costulata* vorläge, bestätigt, nur ist dieselbe nicht auf v. Siebold, sondern auf Hensche zurückzuführen. Anlass dazu bot wohl die der Diagnose folgende Bemerkung Nilssons: An Pupa *doliolum*, Drap. Hist. des Moll. p. 62 t. 3 fig. 41, 42?, der jedoch weiter hinzugefügt ist: figg. 43, 44 (*P. dolium* und *P. obtusa*) ejusdem tabulae formam testae nostrae melius referunt. At nostra differt magnitudine multo minore, anfractibus paucioribus etc.

Hiernach muss also der Fundort Danzig für Pupa *doliolum* definitiv gestrichen werden.

Berlin, Februar 1880.

Reinhardt.

Herr Prof. Fr. Erjavec in Görz, welcher im März 1877 (Die malak. Verhältn. der gefürst. Grafschaft Görz p. 17) eine lebende *Testacella haliotidea* gefunden, sandte mir vor einigen Tagen ein zweites aus dem Görzer Volksgarten. Das Thier kam nach zweitägiger Reise munter hier an und wurde nach kurzer Rast nach Görz zurückgeschickt, wo es ohne Zweifel glücklich wieder eingetroffen ist.

D. F. Heynemann.

Literaturbericht.

The Journal de Conchology. Vol. II. No. 10. October 1879.

p. 310. Hey, the Rev. W. C., Contributions to a better knowledge of the Land- and Freshwater Shells of Yorkshire.

p. 315. Scharff, Robert, Land- and Freshwater Shells collected in the Alluvium of the Garonne, France.

p. 317. Brazier, J., List of *Cypraea* found in Moreton Bay, Queensland.

Noch unvollendet; der Autor vertritt die spezifische Selbstständigkeit der *Cypraea caput-anguis* Phil.

The Annals and Magazine of Natural History. Fifth Series. Vol 3.

p. 1. Owen, Richard, Supplementary Observations on the Anatomy of *Spirula australis*. — With Plates 1—3.

p. 181. Hutton, F. W., on the structure of *Amphibola avellana*. With platte 22. — Vol. 4.

p. 163. Godwin-Austen, H. H., Description of two new Species of

Plectopylis, a Subg. of the Helicidae (H. minor von Darjiling und Hanleyi von Sikkim.

- p. 164. *Normann, A. M.*, on the occurrence of *Neomenia* (*Solenopsis*) in the British Seas.
p. 303. *Blake, J. F.*, on the Homologies of the Cephalopoda.
p. 341. *Nevill, G.*, Description of a new species of *Acme* and Varieties from the Conglomerate Beds at Menton (*A. Folini* mit var. *emaciata* und *pachystoma*).

Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de la Republica Argentina. Tomo III. Entrega.

- p. 63. *Döring, Adolfo*, Apuntes sobre la Fauna de Molluscos de la Republica Argentina. — Cuarta Parte.

Als neu beschrieben werden *Peronaeus Famatinus* aus der Sierra de la Roja, bis 2000 M., *P. Calchaquinus* aus der Sierra de Belen; — *Scutalus oxylabris* aus der Sierra de Cordoba, *Sc. peristomatus* aus der Sierra de Pocho; *Sc. conspicuus* aus der Sierra de Tucuman; — *Bulinulus centralis* aus der Sierra de Cordoba, *monticola* aus der Sierra de los Granadillos bei 3300–4000 M.; *tortoranus* aus der Sierra de Pocho; — *Pupilla microdonta* von Entrerios, *dicrodonta* aus der Sierra de Mendoza, *Clessini* von ebenda. Beigefügt ist ein vergleichendes Verzeichniss der süd-amerikanischen Pupen. Von den meisten *Bulinulus* wird der Kiefer beschrieben; ausserdem finden wir noch anatomische Angaben über *B. apodemetes* d'Orb., *sporadicus* d'Orb., *poecilus* d'Orb.

Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin. 1880. No. 1. (20. Jan.).

- p. 9. *Hartmann*, über *Tethys fimbriata*.
p. 12. *Reinhardt, O.*, über die zum Subgenus *Orcula* Held gehörigen Pupa-Arten und deren geographische Verbreitung.
p. 22. *Martens, Ed. von*, über vorspringende Linien an der Oberfläche einiger Muschelschalen. Mit Holzschnitt

Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg 1877. Hamburg 1879.

- p. 244. *Helix granulata* Alder in der Hamburger Fauna v. H. Petersen.

Mittheilungen und Anfragen.

B i t t e.

Der Unterzeichnete ist mit Untersuchungen über den Einfluss des Bodens und Klima's auf das Gehäuse der *Helix arbustorum* beschäftigt. Derselbe richtet an alle Malakozoologen des In- und Auslandes die Bitte, ihn mit Untersuchungsmaterial unterstützen zu wollen. Erwünscht sind sehr zahlreiche Exemplare von jedem Fundorte, da das Gehäuse der genannten Schnecke an jedem Orte ganz unglaublich variirt. Ferner werden Notizen über die Gebirgs- und Bodenart und die Meereshöhe des Fundortes erbeten.

Die Vorstände malakozoologischer Gesellschaften und die Herausgeber malakozoologischer Zeitschriften werden höflichst ersucht, zur Weiterverbreitung obiger Bitte beitragen zu wollen.

Forstacademie Tharand bei Dresden.

Kunze, Professor.